





FONDATION POUR LES
STRUCTURES D'ACCUEIL
EXTRAFAMILIAL
VILLARS-SUR-GLANE




Liste des maladies admises en accueil collectif pour la crèche
Arc-en-ciel & les Dauphins

Maladie	Dans quel cas mon enfant peut-il être accueilli ou non en milieu collectif ?
Angine (virus)	Absence de fièvre et un bon état général
Angine à streptocoques	48h après la première prise du traitement antibiotiques, absence de fièvre et bon état général
Bronchite / bronchiolite (souvent virus RSV)	Dangereux pour les enfants de 0-2 ans. Retour après 5-6 jours de traitement et un bon état général
Cinquième maladie (Erythème infectieux / parvovirus)	Pas d'éviction mais dangereux pour les femmes enceintes
Conjonctivite virale	L'enfant peut être accueilli (l'œil rouge ne coule pas)
Conjonctivite bactérienne	Si l'œil est rouge avec du pus, l'enfant pourra revenir 48h après la première prise des gouttes antibiotiques
Coqueluche	Déclaration au médecin cantonal. L'enfant reste deux semaines à la maison avec un traitement d'antibiotiques (intégré à la vaccination)
Covid-19	L'enfant revient après la fin de la quarantaine et 48h sans symptôme
Faux-croup	Pas d'éviction si bon état général
Fièvre	0-4 mois dès 38 °C (toujours montrer le bébé au pédiatre) / 4 mois et plus dès 38,5 °C
Gale	L'enfant revient 48h après le début du traitement
Gastroentérite / gastrite	Bon état général + absence de vomissement et de diarrhée pendant 24h
Grippe (virus influenza)	4-5 jours à la maison / absence de fièvre et bon état général
Herpès (gingivo-stomatite)	Eviction de 6 à 10 jours. Retour après disparition des symptômes

Impétigo (bactérie)	Pas d'éviction mais traitement avec une crème antibiotique obligatoire
Laryngite-pharyngite	Pas d'éviction si bon état général
Molluscum (poxvirus)	Pas d'éviction
Muguet / mycose	Pas d'éviction mais doit être rapidement traité
Otite	Retour de l'enfant possible dès que la douleur a été contrôlée
Parotidite (oreillons)	4-5 jours à la maison (intégré dans la vaccination)
Pied-main-bouche (virus coxsachie)	L'enfant reste à la maison pendant la durée des symptômes (peut durer une semaine ou plus). Les selles restent contagieuses 2 semaines. Dangereux pour les femmes enceintes
Pneumonie	L'enfant peut revenir 4 jours après le début du traitement antibiotiques
Poux	L'enfant peut revenir après la 1 ^{ère} prise du traitement
Roséole ou fièvre des 3 jours ou exanthème subit	L'enfant peut revenir dès l'apparition des rougeurs/petits boutons = fin de la maladie, sans fièvre et un bon état général
Rougeole	Déclaration au médecin cantonal et hospitalisation (intégré à la vaccination). Le médecin cantonal décide de la durée de l'éviction
Rubéole	Retour après la disparition des symptômes et bon état général (intégré à la vaccination) Dangereux pour les femmes enceintes
Scarlatine (A, B, C)	L'enfant peut revenir après 3 jours d'antibiotiques
Varicelle	L'enfant peut revenir lorsque tous les boutons sont secs

Ce présent document a été élaboré en collaboration avec le Dr.Gysler.

Lieu et date..... Villars-sur-Glâne
19.1.2021

Signature..... 

Dr med. Alvin Gysler
Spéc. FMH pédiatrie
Rue du Centre 8
1752 Villars-sur-Glâne
026 407 78 78